

# 10

## Differentialgleichungen mit trennbaren Variablen

Jörn Loviscach

Versionsstand: 28. März 2015, 21:32

Die nummerierten Felder sind absichtlich leer, zum Ausfüllen beim Ansehen der Videos:  
<http://www.j3L7h.de/videos.html>



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Germany License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/> or send a letter to Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

---

Bitte hier notieren, was beim Bearbeiten unklar geblieben ist

### 1 Prinzip

Die Trennung der Variablen [separation of variables] ist ein beliebter Trick, um Differentialgleichungen erster Ordnung (und *nur* erster Ordnung) zu lösen, insbesondere auch nichtlineare. Zum Beispiel die Differentialgleichung

$$e^y y' \stackrel{!}{=} x^5 \quad \text{mit} \quad y(3) \stackrel{!}{=} 7$$

hat „trennbare“ Variablen [separable variables]: Auf der einen Seite steht nur  $y'$  mal eine Funktion von  $y$ ; auf der anderen Seite steht nur  $x$ . Versuchen wir, beide Seiten vom Startpunkt  $(x|y) = (3|7)$  bis zu einem noch unbekanntem Endpunkt  $(x_1|y_1)$  zu integrieren:

---

Das linke Integral vereinfacht sich netterweise wegen der Substitutionsregel:

---

Und es ergibt sich als Lösung:

---

Vorsicht: Das Auflösen nach  $y_1$  kann problematisch sein. Wann zum Beispiel?

Rein formal kann man ohne Substitutionsregel arbeiten, indem man die Differentialgleichung umformt zu

---

und dann auf beiden Seiten von  $(x|y) = (3|7)$  bis  $(x_1|y_1)$  integriert:

---

Manche Leute verzichten auf die Anfangs- und Endwerte und schreiben unbestimmte Integrale. Aber dann darf man nicht vergessen, eine Integrationskonstan-

te dazuzuschreiben:

6